| 対象がん腫 | ﾚｼﾞﾒﾝ番号 | ﾚｼﾞﾒﾝ名 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎症性腸疾患 | R01404 | ﾚﾐｹｰﾄﾞ 5mg/kg 初回～3回目 | 14日 | | |
| 留意事項 | | | | | |
| 投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用 | | | | | |

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液(光)【50mL】 | 1本 | 点滴<br>5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | レミケード点滴静注<br>生食〔500mL〕「光」 | 5mg/kg<br>1本 | 点滴<br>4.5時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液(光)【50mL】 | 1本 | 点滴<br>5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |