対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
大腸がん	R03605	mFOLFOX6療法+ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	14日	中等度	ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ：非炎症性 ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ：炎症性
留意事項					
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用 ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ投与と同時に側管からﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄを投与（※1） 持続点滴のﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙは、全量95mLでｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ2mL/hrで投与（※2）					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 アロキシ静注0．75mg(5mL) ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL ポララミン注5mg(1mL) ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用【20mg】	1本 1本 1本 1本 1本	点滴 30分	↓													
2	生理食塩液(光)【50mL】	1本	点滴 5分	↓													
3	生食『100mL』(光)生理食塩液 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ点滴静注	1本 6mg/kg	点滴 1時間	↓													
4	生理食塩液(光)【50mL】	1本	点滴 5分	↓													
5	5%ブドウ糖注射液《200mL》「ﾌｿｰ」 レボホリナート点滴静注	1本 200mg/㎡	側管 点滴 2時間	↓ ※1													
6	5%ブドウ糖注射液(500mL) オキサリプラチン点滴静注液	1本 85mg/㎡	点滴 2時間	↓													
7	生理食塩液(光)【50mL】 フルオロウラシル注	1本 400mg/㎡	点滴 10分	↓													
8	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	↓													
9	生食《50mL》(光)生理食塩液 フルオロウラシル注	1本 2400mg/㎡	持続点滴 46時間	↓ ※2													