対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
大腸がん	R03611	FOLFOXIRI療法(高催吐)	14日		イリノテカン: 炎症性 オキサリプ・ラチン: 炎症性
留意事項	フルオロウラシル:炎症性				
経口制吐剤:アプレピタント オキサリプラチン投与と同時 持続点滴のフルオロウラシル					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL アロキシ静注0. 75mg(5mL) ポララミン注5mg(1mL) ファモチジン注射用【20mg】	1本 9.9mg 1本 1本 1本	点滴 25分	<b>\</b>													
2	生食【250mL】(光)生理食塩液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	1本 150mg/㎡	点滴 1時間	1													
3	5%ブドウ糖注射液(500mL) オキサリプラチン点滴静注液	1本 85mg/m <sup>2</sup>	点滴 2時間	1													
4	5%ブドウ糖注射液《200mL》「フソー」 レボホリナート点滴静注	1本 200mg/㎡	側管 点滴 2時間	<b>→</b> <b>※</b> 1													
5	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	1													
6	生食《50mL》(光)生理食塩液 フルオロウラシル注	1本 2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴 46時間	↓ ※2													