| 対象がん腫 | ﾚｼﾞﾒﾝ番号 | ﾚｼﾞﾒﾝ名 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸がん | R03612 | FOLFOXIRI療法 ｱﾚﾙｷﾞｰ用（高催吐） | 14日 | 高度 | ｲﾘﾉﾃｶﾝ：炎症性<br>ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性<br>ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ：炎症性 |

**留意事項**

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠8mg(day2-4)
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ投与開始2時間後より、側管からﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄを投与（※1）
持続点滴のﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙは、全量95mLでｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ2mL/hrで投与（※2）

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食『100mL』（光）生理食塩液<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL<br>アロキシ静注0. 75mg（5mL）<br>ポララミン注5mg(1mL)<br>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用【20mg】 | 1本<br>3本<br>1本<br>1本<br>1本 | 点滴 25分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生食【250mL】（光）生理食塩液<br>イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 1本<br>150mg/㎡ | 点滴 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5%ブドウ糖注射液(500mL)<br>オキサリプラチン点滴静注液 | 1本<br>85mg/㎡ | 点滴 4時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5%ブドウ糖注射液《200mL》「ﾌｿｰ」<br>レボホリナート点滴静注 | 1本<br>200mg/㎡ | 側管<br>点滴 2時間 | ↓<br>※1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食《50mL》（光）生理食塩液 | 1本 | 点滴 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食《50mL》（光）生理食塩液<br>フルオロウラシル注 | 1本<br>2400mg/㎡ | 持続点滴<br>46時間 | ↓<br>※2 | | | | | | | | | | | | | |