対象がん腫	レジメン番号	レジメン名		血管への影響	
大腸がん	R03613	FOLFOXIRI療法+ベバシズマブ(高催吐)	14日	高度	べ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙
留意事項	オキサリプラチン:炎症性				
経口制吐剤:アプレピタント ヘ、バシス、マフ、は血圧が150 オキサリフ。ラチン投与と同時 持続点滴のフルオロウラシル	フルオロウラシル:炎症性				

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	<b>\</b>													
2	生食『100mL』(光)生理食塩液 ベバシズマブBS点滴静注	1本 5mg/kg	点滴 90分	<b>→</b> <b>※</b> 1													
3	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL アロキシ静注0.75mg(5mL) ポララミン注5mg(1mL) ファモチシン注射用【20mg】	1本 9.9mg 1本 1本 1本	点滴 25分	<b>\</b>													
4	生食【250mL】(光)生理食塩液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	1本 150mg/㎡	点滴 1時間	<b>\</b>													
5	5%ブドウ糖注射液(500mL) オキサリプラチン点滴静注液	1本 85mg/㎡	点滴 2時間	<b>\</b>													
6	5%ブドウ糖注射液《200mL》「フソー」 レボホリナート点滴静注	1本 200mg/㎡	側管 点滴 2時間	↓ ※2													
7	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	$\downarrow$													
8	生食《50mL》(光)生理食塩液 フルオロウラシル注	1本 2400mg/m <sup>2</sup>	持続点滴 46時間	<b>↓</b> <b>※</b> 3													