対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
大腸がん	R03615	XELOX療法	21日	中等度	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性
留意事項					
併用経口抗がん剤：ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ（2000mg/㎡/日 14日間：day1夕-day15朝） ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ投与時、温罨法実施 ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ投与と同時に側管からﾃﾞｷｻｰﾄを投与（※）					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』（光）生理食塩液 アロキシ静注0．75mg（5mL） ポララミン注5mg(1mL) ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用【20mg】	1本 1本 1本 1本	点滴 30分	↓																				
2	5%ブドウ糖注射液(500mL) オキサリプラチン点滴静注液	1本 130mg/㎡	点滴 2時間	↓																				
3	5%ブドウ糖注射液＜100mL＞ デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	側管 点滴 2時間	↓※																				
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 10分	↓																				