対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
肉腫	R05013	肉腫 AI療法（高催吐）	21日	高度	ｲﾎﾏｲﾄﾞ：炎症性 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ：壊死性

留意事項

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3,(4),(5))
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ投与時、温罨法実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	グラニセトロン点滴静注液3mgBag デキサート6．6mg注/2mL	1本 9.9mg	点滴 15分	↓	↓	↓	↓	↓																
2	生食〔500mL〕「光」 注射用イホマイド	1本 2g/㎡	点滴 4時間	↓	↓	↓	↓	↓																
3	ウロミテキサン注 生食《50mL》(光)生理食塩液	400mg/㎡ 1本	点滴 30分	↓	↓	↓	↓	↓																
4	生食【250mL】(光)生理食塩液 ドキソルビシン塩酸塩注射液	1本 30mg/㎡	点滴 2時間	↓	↓																			
5	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓	↓																			
6	ウロミテキサン注 生食《50mL》(光)生理食塩液	400mg/㎡ 1本	点滴 30分	↓	↓	↓	↓	↓																
7	ウロミテキサン注 生食《50mL》(光)生理食塩液	400mg/㎡ 1本	点滴 30分	↓	↓	↓	↓	↓																