| 対象がん腫 | ﾚｼﾞﾒﾝ番号 | ﾚｼﾞﾒﾝ名 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悪性黒色腫 | R05015 | 悪性黒色腫 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ・ﾔｰﾎﾞｲ | 21日 | 最小度 | ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ：非炎症性<br>ﾔｰﾎﾞｲ：非炎症性 |

| 留意事項 |
|---|
| 投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用<br>ﾎﾟｰﾄから投与の場合ｶﾃｰﾃﾙの素材を確認 |

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食《50mL》(光)生理食塩液 | 1本 | 点滴 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生食《50mL》(光)生理食塩液<br>オプジーボ点滴静注 | 1本<br>80mg/body | 点滴 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食《50mL》(光)生理食塩液 | 1本 | 点滴 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食『100mL』(光)生理食塩液<br>ヤーボイ点滴静注液 | 1本<br>3mg/kg | 点滴 90分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食『100mL』(光)生理食塩液 | 1本 | 点滴 10分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |