対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
前立腺がん	R06101	ｼﾞｪﾌﾞﾀﾅ	21日	軽度	ｼﾞｪﾌﾞﾀﾅ：非炎症性
留意事項					
投与時はPVCﾌﾘｰﾗｲﾝでｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ｼﾞｪﾌﾞﾀﾅ投与時、ﾌﾛｰｽﾞﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ使用					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL ポララミン注5mg(1mL) ファモチジン注射用≪20mg≫	1本 1本 1本 1本	点滴 25分	↓																				
2	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 25分	↓																				
3	生食【250mL】(光)生理食塩液 ジェブタナ点滴静注	1本 25mg/㎡	点滴 60分	↓																				
4	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓																				