対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
膀胱・尿路上皮がん	R06104	GC療法2分割法 day1-6（高催吐）	28日	高度	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ：炎症性 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性

留意事項

『R06105 GC療法 day 8, 15』別途ﾚｼﾞﾒﾝあり
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)、ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ投与時、温罨法実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d22	…	…	d28
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 1本	点滴 30分	↓																				
2	ゲムシタビン点滴静注 5%ブドウ糖注射液【100mL】	1000mg/㎡ 1本	点滴 30分	↓																				
3	『ソリューゲンF注』500mL	1本	点滴 6時間	↓																				
4	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 6時間	↓																				
5	『ソリューゲンF注』500mL	1本	点滴 6時間	↓																				
6	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 6時間		↓																			
7	生食『100mL』(光)生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL アロキシ静注0. 75mg(5mL)	1本 1本 1本	点滴 30分		↓																			
8	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 生食〔500mL〕「光」	35mg/㎡ 500mL	点滴 2.5時間		↓																			
9	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注20mg「ﾄｰﾜ」(2mL)	1本	側管　静注		↓																			
10	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 2.5時間		↓																			
11	マンニットールS注射液(300mL)	1本	点滴 1.5時間		↓																			
12	『ソリューゲンF注』500mL	1本	点滴 5時間		↓	↓	↓																	
13	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 5時間		↓	↓	↓																	
14	生食『100mL』(光)生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 1本	点滴 30分			↓	↓	↓	↓															
15	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 生食〔500mL〕「光」	35mg/㎡ 500mL	点滴 2.5時間			↓																		
16	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注20mg「ﾄｰﾜ」(2mL)	1本	側管　静注			↓																		
17	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 2.5時間			↓																		
18	マンニットールS注射液(300mL)	1本	点滴 1.5時間			↓																		
19	『ソリューゲンF注』500mL	1本	点滴 5時間			↓	↓																	
20	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 5時間			↓	↓																	