対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
膀胱・尿路上皮がん	R06106	MVAC療法day 1-5（高催吐）	28日	高度	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ：非炎症性 ｴｸｻﾞｰﾙ：壊死性 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ：壊死性 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性

留意事項

『R06107 MVAC療法day 15, 22』別途ﾚｼﾞﾒﾝあり
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)、ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ投与時、温罨法実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d22	…	…	d28
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴 30分	↓																				
2	生食『100mL』(光)生理食塩液 メソトレキセート注射	1本 30mg/㎡	点滴 30分	↓																				
3	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 6時間	↓																				
4	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 6時間	↓	↓																			
5	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 6時間	↓																				
6	生食『100mL』(光)生理食塩液 アロキシ静注0．75mg(5mL) ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 1本 2本	点滴 30分		↓																			
7	生食《50mL》(光)生理食塩液 エクザール注射	1本 3mg/㎡	点滴 5分		↓																			
8	生食『100mL』(光)生理食塩液 ドキソルビシン塩酸塩注射液	1本 30mg/㎡	点滴 30分		↓																			
9	生食〔500mL〕「光」 シスプラチン注	400mL 70mg/㎡	点滴3時間		↓																			
10	フロセミド注20mg「トーワ」(2mL)	1本	側管　静注		↓																			
11	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 2.5時		↓																			
12	マンニットールS注射液(300mL)	1本	点滴 1.5時間		↓																			
13	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 5時間		↓																			
14	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 5時間		↓																			
15	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 5時間			↓																		
16	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴 30分			↓	↓	↓																
17	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 5時間			↓																		
18	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 5時間			↓																		