対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
頭頸部がん	R09031	PF療法（高催吐）	21日	高度	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ：炎症性
留意事項					
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソリューゲンF注500mL 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 3本	点滴 4.5時間	↓																				
2	生食〔500mL〕「光」	1本	点滴 3.5時間	↓																				
3	YDソリタT1号輸液（500mL）	1本	点滴 6.5時間	↓																				
4	YDソリタT1号輸液（500mL）	1本	点滴 8時間		↓	↓	↓	↓	↓	↓														
5	YDソリタT1号輸液（500mL）	1本	点滴 8時間		↓	↓	↓	↓	↓	↓														
6	YDソリタT1号輸液（500mL）	1本	点滴 8時間		↓	↓	↓	↓	↓	↓														
7	生食『100mL』（光）生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL アロキシ静注0. 75mg（5mL）	1本 2本 1本	側管① 点滴 30分	↓																				
8	生食『100mL』（光）生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 1本	側管① 点滴 30分		↓	↓	↓	↓																
9	ラクテック注(500mL)	1本	側管① 点滴 3.5時間	↓	↓	↓																		
10	生食【250mL】（光）生理食塩液 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注	1本 70mg/㎡	側管① 点滴 3時間	↓																				
11	ヒシナルク3号液500mL ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注	1本 10mg	側管① 点滴 2.5時間	↓	↓	↓																		
12	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	側管② 点滴 5分	↓																				
13	生食〔500mL〕「光」 フルオロウラシル注	1本 700mg/㎡	側管② 点滴24時間	↓	↓	↓	↓	↓																
14	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	側管② 点滴 5分						↓															