対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
頭頸部がん	R09032	PF療法+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ（高催吐）	21日	高度	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ：炎症性 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ：非炎症性

留意事項

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞはｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用し側管から投与

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	…	…	…	…	d15	d16	…	…	…	…	d21
1	ソリューゲンF注500mL 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 3本	点滴 4.5時間	↓																			
2	生食〔500mL〕「光」	1本	点滴 3.5時間	↓																			
3	YDソリタT1号輸液（500mL）	1本	点滴 6.5時間	↓																			
4	YDソリタT1号輸液（500mL）	1本	点滴 8時間		↓	↓	↓	↓	↓														
5	YDソリタT1号輸液（500mL）	1本	点滴 8時間		↓	↓	↓	↓	↓														
6	YDソリタT1号輸液（500mL）	1本	点滴 8時間		↓	↓	↓	↓	↓														
7	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	側管① 点滴 5	↓																			
8	生食《50mL》（光）生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	1本 200mg/body	側管① 点滴 30分	↓																			
9	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	側管① 点滴 5	↓																			
10	生食『100mL』（光）生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg（5mL）	1本 2本 1本	側管① 点滴 30分	↓																			
11	生食『100mL』（光）生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 1本	側管① 点滴 30分		↓	↓	↓																
12	ラクテック注(500mL)	1本	側管① 点滴 3.5時間	↓	↓	↓																	
13	生食【250mL】（光）生理食塩液 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注	1本 100mg/㎡	側管① 点滴 3時間	↓																			
14	ヒシナルク3号液500mL ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注	1本 10mg	側管① 点滴 2.5時間	↓	↓	↓																	
15	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	側管② 点滴 5	↓																			
16	生食〔500mL〕「光」 フルオロウラシル注	1本 1000mg/㎡	側管② 点滴24時間	↓	↓	↓	↓																
17	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	側管② 点滴 5					↓															