対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
頭頸部がん	R09034	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 100mg/m2（高催吐）	21日	高度	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性

留意事項

ﾌﾟﾚﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝは別途に前日から投与
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg（5mL）	1本 1.5本 1本	点滴 30分	↓																				
2	生食〔500mL〕「光」 塩化ナトリウム注10%シリンジ（20mL） シスプラチン注	1本 3本 100mg/㎡	点滴 4.5時間	↓																				
3	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 4時間	↓																				
4	マンニットールS注射液（300mL）	1本	側管 点滴 2時間	↓																				
5	フロセミド注20mg「トーワ」（2mL）	1本	静注 one shot	↓																				
6	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 4時間	↓																				
7	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 4時間	↓																				
8	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 8時間		↓	↓	↓																	
9	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴 30分		↓	↓																		
10	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 0.5本	点滴 30分				↓																	
11	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 8時間		↓	↓	↓																	
12	ソリューゲンF注500mL	1本	点滴 8時間		↓	↓	↓																	