| 対象がん腫 | ﾚｼﾞﾒﾝ番号 | ﾚｼﾞﾒﾝ名 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭頸部がん | R09036 | CF療法+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ（高催吐） | 21日 | 高度 | ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性<br>ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ：炎症性 |

**留意事項**

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞはｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用し主管から投与

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食《50mL》（光）生理食塩液 | 1本 | 点滴 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生食《50mL》（光）生理食塩液<br>キイトルーダ点滴静注 | 1本<br>200mg/body | 点滴 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | YDソリタT1号輸液（500mL） | 1本 | 点滴 12時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | YDソリタT1号輸液（500mL） | 1本 | 点滴 12時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食《50mL》（光）生理食塩液 | 1本 | 側管①<br>点滴 5分 | ↓ | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食〔500mL〕「光」<br>フルオロウラシル注 | 1本<br>1000mg/㎡ | 側管①<br>点滴 24時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 生食『100mL』（光）生理食塩液<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL<br>アロキシ静注0．75mg（5mL） | 1本<br>1.5本<br>1本 | 側管②<br>点滴 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 生食『100mL』（光）生理食塩液<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL | 1本<br>1本 | 側管②<br>点滴 30分 | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 生食【250mL】（光）生理食塩液<br>カルボプラチン点滴静注 | 1本<br>5AUC | 側管②<br>点滴 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 生食『100mL』（光）生理食塩液 | 1本 | 側管②<br>点滴 10分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |