対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
頭頸部がん	R09038	TC療法+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ 1ｻｲｸﾙ目 day 1	21日	中等度	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ：非炎症性 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：壊死性 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性

留意事項

『R09039 TC療法+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ 1ｻｲｸﾙ目 day 8，15』別途ﾚｼﾞﾒﾝあり
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与後、『Rp2 生食【250mL】(光)生理食塩液』を200ml/hrで1時間経過観察(※)

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 アロキシ静注 デキサート6．6mg注/2mL ポララミン注5mg(1mL) ファモチジン注射用≪20mg≫	1本 1本 1本 1本 1本	点滴 30分	↓																				
2	生食【250mL】(光)生理食塩液 アービタックス注射液	1本 400mg/㎡	点滴 120分	↓																				
3	生食【250mL】(光)生理食塩液	1本	点滴 80分	↓※																				
4	生食【250mL】(光)生理食塩液 パクリタキセル注射液	1本 100mg/㎡	点滴 60分	↓																				
5	生食【250mL】(光)生理食塩液 カルボプラチン点滴静注	1本 2.5AUC	点滴 30分	↓																				
6	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓																				