対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
頭頸部がん	R09040	TC療法+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ 2ｻｲｸﾙ目以降	21日	中等度	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ：非炎症性 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：壊死性 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性
留意事項					
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用（day15はｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ不要）					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』（光）生理食塩液 アロキシ静注 デキサート6．6mg注/2mL ポララミン注5mg（1mL） ファモチジン注射用≪20mg≫	1本 1本 1本 1本 1本	点滴 30分	↓							↓													
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL ポララミン注5mg（1mL）	1本 1本 1本	点滴 30分															↓						
3	生食【250mL】（光）生理食塩液 アービタックス注射液	1本 250mg/㎡	点滴 60分	↓							↓							↓						
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 30分	↓							↓							↓						
5	生食【250mL】（光）生理食塩液 パクリタキセル注射液	1本 100mg/㎡	点滴 60分	↓							↓													
6	生食【250mL】（光）生理食塩液 カルボプラチン点滴静注	1本 2.5AUC	点滴 30分	↓							↓													
7	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 10分	↓							↓													