

| 対象がん腫 | レジメン番号 | レジメン名 | インターバル | 催吐性 | 血管への影響 |
|-----------------|--------|------------------------------|--------|-----|-----------------------------|
| 頭頸部がん | R09046 | パクリタキセル+アービタックス weekly 2回目以降 | 7日 | 軽度 | アービタックス:非炎症性 パクリタキセル:壊死性 |
| 留意事項 | | | | | |
| 投与時インラインフィルター使用 | | | | | |

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
|----|---|----------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート6. 6mg注/2mL ポララミン注5mg(1mL) ファモチジン注射用<<20mg>> | 1本 1本 1本 1本 | 点滴 30分 | ↓ | | | | | | |
| 2 | 生食【250mL】(光)生理食塩液 アービタックス注射液 | 1本 250mg/m ² | 点滴 60分 | ↓ | | | | | | |
| 3 | 生食『100mL』(光)生理食塩液 | 1本 | 点滴 20分 | ↓ | | | | | | |
| 4 | 生食【250mL】(光)生理食塩液 パクリタキセル注射液 | 1本 80mg/m ² | 点滴 60分 | ↓ | | | | | | |
| 5 | 生食『100mL』(光)生理食塩液 | 1本 | 点滴 10分 | ↓ | | | | | | |