対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
非小細胞肺がん	R20103	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+S-1（高催吐）	21日	高度	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性
留意事項					
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠8mg(day2-4) 併用経口抗がん剤：S-1(80mg/㎡/日 14日間)					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 アロキシ静注0．75mg(5mL) デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本 9.9mg	点滴　15分	↓																				
2	生食【250mL】(光)生理食塩液 カルボプラチン点滴静注液	1本 5AUC	点滴　30分	↓																				
3	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴　10分	↓																				