

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
非小細胞肺癌	R20105	カルボプラチン+アブラキサン(day1-15セット)(高催吐)	21日	高度	カルボプラチン: 炎症性 アブラキサン: 壊死性
留意事項					
経口制吐剤: アプレピタント125mg(day1),80mg(day2,3)、テカトロン錠8mg(day2-4)					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL アロキシ静注0.75mg(5mL)	1本 9.9mg 1本	点滴 15分	↓																				
2	生食《50mL》(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL	1本 1本	点滴 15分								↓							↓						
3	生食《50mL》(光)生理食塩液 アブラキサン点滴静注	1本 100mg/m ²	点滴 30分	↓							↓							↓						
4	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	↓																				
5	生食【250mL】(光)生理食塩液 カルボプラチン点滴静注液	1本 6AUC	点滴 30分	↓																				
6	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓							↓							↓						