

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
非小細胞肺癌	R20106	カルボプラチン+アブラキサン+キイトルーダ <sup>®</sup> (day1-15セット)(高催吐)	21日	高度	カルボプラチン: 炎症性 アブラキサン: 壊死性 キイトルーダ: 非炎症性
留意事項					
経口制吐剤: アプレピタント125mg(day1),80mg(day2,3)、デカドロン錠8mg(day2-4) day1のみ投与時インラインフィルター使用。ただし、アブラキサンはフィルターを使用せず側管から投与(※)					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL アロキシ静注0.75mg(5mL)	1本 9.9mg 1本	点滴 15分	↓																				
2	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	↓																				
3	生食《50mL》(光)生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	1本 200mg/body	点滴 30分	↓																				
4	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	↓																				
5	生食《50mL》(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL	1本 1本	点滴 15分								↓							↓						
6	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	↓※																				
7	生食《50mL》(光)生理食塩液 アブラキサン点滴静注	1本 100mg/m <sup>2</sup>	点滴 30分	↓※							↓							↓						
8	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	↓※																				
9	生食【250mL】(光)生理食塩液 カルボプラチン点滴静注液	1本 6AUC	点滴 30分	↓																				
10	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓							↓							↓						