対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	催吐性	血管への影響	
非小細胞肺がん	R20107	カルボプラチン+パクリタキセル(高催吐)	21日		カルホ`プラチン:炎症性 パクリタキセル:壊死性
留意事項	ハブグイビル・扱うしは				
経口制吐剤:アプレピタント 前処置薬:パクリタキセル投 投与時インラインフィルター使ノ					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12c	113	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生理食塩液(光)(100mL) デキサート6.6mg注/2mL アロキシ静注0.75mg(5mL) ファモチジン注射用≪20mg≫	1本 9.9mg 1本 1本	点滴 15	5分	<b>↓</b>																				
2	生理食塩液(光)(100mL)	1本	点滴 30	)分	↓																				
3	生食[500mL]「光」 パクリタキセル注射液	1本 200mg/㎡	点滴 180	0分	↓																				
4	生食【250mL】(光)生理食塩液 カルボプラチン点滴静注	1本 6AUC	点滴 30	)分	↓																				
5	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10	)分	↓																				