対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
非小細胞肺がん	R20108	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ（高催吐）	21日	高度	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：壊死性

留意事項
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠8mg(day2-4) 前処置薬：ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ投与30分前ﾚｽﾀﾐﾝ5錠内服 投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生理食塩液（光）（100mL） デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg（5mL） ファモチジン注射用≪20mg≫	1本 9.9mg 1本 1本	点滴　15分	↓																				
2	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	点滴　5分	↓																				
3	生食《50mL》（光）生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	1本 200mg/body	点滴　30分	↓																				
4	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	点滴　5分	↓																				
5	生食〔500mL〕「光」 パクリタキセル注射液	1本 200mg/㎡	点滴　180分	↓																				
6	生食【250mL】（光）生理食塩液 カルボプラチン点滴静注	1本 6AUC	点滴　30分	↓																				
7	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓																				