対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
非小細胞肺がん	R20113	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ｻｲﾗﾑｻﾞ【3回目以降】	21日	軽度	ｻｲﾗﾑｻﾞ：非炎症性 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ：壊死性

留意事項
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ投与時、ﾌﾛｰｽﾞﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ使用

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL ポララミン注5mg(1mL) ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用【20mg】	1本 1本 1本 1本	点滴　15分	↓																				
2	生食【250mL】(光)生理食塩液 サイラムザ点滴静注液	1本 10mg/kg	点滴　1時間	↓																				
3	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴　5分	↓																				
4	生理食塩液「ﾋｶﾘ」250mL ドセタキセル点滴静注	1本 60mg/㎡	点滴　60分	↓																				
5	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴　10分	↓																				