対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
非小細胞肺がん	R20115	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ(高催吐)	21日	高度	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ：炎症性

留意事項

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠8mg(day2-4)
水分摂取の励行：ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ投与当日点滴前飲水1L、点滴後飲水1L、翌日から翌々日まで1日飲水1L
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ投与時、温罨法実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食〔500mL〕「光」 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg（5mL）	1本 9.9mg 1本	点滴　15分	↓																				
3	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴　15分								↓													
4	5%ブドウ糖注射液＜100mL＞ ゲムシタビン点滴静注	1本 1000mg/㎡	点滴　30分	↓							↓													
5	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴　1時間	↓																				
6	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分								↓													
7	生食【250mL】（光）生理食塩液 シスプラチン注	1本 80mg/㎡	点滴　60分	↓																				
8	フロセミド注20mg「トーワ」（2mL）	1本	静注 one　shot	↓																				
9	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫ 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓																				