対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
非扁平上皮肺がん	R20208	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｱﾘﾑﾀ+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ（高催吐）	21日	高度	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ｱﾘﾑﾀ：非炎症性 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ：非炎症性

留意事項

葉酸：ｱﾘﾑﾀ初回投与の7日以上前から葉酸0.5mg/回/日を連日投与
　　ｱﾘﾑﾀの投与を中止または終了する場合には、ｱﾘﾑﾀ最終投与日から22日目まで葉酸を投与
ﾋﾞﾀﾐﾝB12：ｱﾘﾑﾀ初回投与の少なくとも7日前に、ﾋﾞﾀﾐﾝB12 1mg/回を筋肉注射
　　ｱﾘﾑﾀ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと（3ｺｰｽごと）に1回投与
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠8mg(day2-4)
水分摂取の励行：ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ投与当日点滴前飲水1L、点滴後飲水1L、翌日から翌々日まで1日飲水1L
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食〔500mL〕「光」 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg（5mL）	1本 9.9mg 1本	点滴　30分	↓																				
3	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	点滴　5分	↓																				
4	生食《50mL》（光）生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	1本 200mg/body	点滴　30分	↓																				
5	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	点滴　5分	↓																				
6	生食『100mL』（光）生理食塩液 アリムタ注射	1本 500mg/㎡	点滴　10分	↓																				
7	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴　1時間	↓																				
8	生食【250mL】（光）生理食塩液 シスプラチン注	1本 75mg/㎡	点滴　60分	↓																				
9	フロセミド注20mg「トーワ」（2mL）	1本	静注one　shot	↓																				
10	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫ 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓																				