対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
小細胞肺がん	R20306	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ（高催吐）	21日	高度	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性

留意事項

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
水分摂取の励行：ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ投与当日点滴前飲水1L、点滴後飲水1L、翌日から翌々日まで1日飲水1L

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食〔500mL〕「光」 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 アロキシ静注0．75mg（5mL） デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本 2本	点滴　15分	↓																				
3	生食《50mL》（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴　15分		↓	↓																		
4	5%ブドウ糖注射液≪500mL≫ エトポシド点滴静注液	1本 100mg/㎡	点滴　60分	↓	↓	↓																		
5	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴　60分	↓																				
6	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分		↓	↓																		
7	生食〔500mL〕「光」 シスプラチン注	1本 80mg/㎡	点滴　60分	↓																				
8	フロセミド注20mg「トーワ」（2mL）	1本	静注 one　shot	↓																				
9	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫ 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓																				