

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
非小細胞肺癌	R20402	カルボプラチン+パクリタキセル(weekly) + 放射線療法	21日	中等度	カルボプラチン: 炎症性 パクリタキセル: 壊死性
留意事項					
前処置薬: パクリタキセル投与30分前レスタミン5錠内服 投与時インラインフィルター使用					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL アロキシ静注0.75mg(5mL) ファモチジン注射用<<20mg>>	1本 1本 1本 1本	点滴 25分	↓							↓							↓						
2	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 25分	↓							↓							↓						
3	生食【250mL】(光)生理食塩液 パクリタキセル注射液	1本 40mg/m ²	点滴 60分	↓							↓							↓						
4	生食『100mL』(光)生理食塩液 カルボプラチン点滴静注	1本 2AUC	点滴 30分	↓							↓							↓						
5	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓							↓							↓						