対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
非小細胞肺がん	R20403	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ＋放射線療法（高催吐）	28日	高度	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ：壊死性

留意事項

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1,day8),80mg(day2,3,day9,10)、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠8mg（day2-4,day9-11）
水分摂取の励行：ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ投与当日点滴前飲水1L、点滴後飲水1L、翌日から翌々日までは1日飲水1L
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ投与時、ﾌﾛｰｽﾞﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ使用

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d21	…	…	d28
1	生食〔500mL〕「光」 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓							↓													
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg（5mL）	1本 9.9mg 1本	点滴　15分	↓							↓													
3	生食【250mL】（光）生理食塩液 ドセタキセル点滴静注	1本 40mg/㎡	点滴　1時間	↓							↓													
4	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴　1時間	↓							↓													
5	生食【250mL】（光）生理食塩液 シスプラチン注	1本 40mg/㎡	点滴　60分	↓							↓													
6	フロセミド注20mg「トーワ」（2mL）	1本	静注 one　shot	↓							↓													
7	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫ 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓							↓													