| 対象がん腫 | ﾚｼﾞﾒﾝ番号 | ﾚｼﾞﾒﾝ名 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸腺腫 | R20501 | ADOC療法（高催吐） | 21日 | 高度 | ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ：壊死性<br>ｵﾝｺﾋﾞﾝ：壊死性<br>ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性<br>ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 |

**留意事項**

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3（4））
水分摂取の励行：ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ投与当日点滴前飲水1L、点滴後飲水1L、翌日から翌々日までは1日飲水1L
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ投与時、温罨法実施

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食〔500mL〕「光」<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL） | 1本<br>8mL | 点滴　1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生食『100mL』（光）生理食塩液<br>デキサート6．6mg注/2mL<br>アロキシ静注0．75mg（5mL） | 1本<br>9.9mg<br>1本 | 点滴　15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食『100mL』（光）生理食塩液<br>デキサート6．6mg注/2mL | 1本<br>1本 | 点滴　15分 | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食『100mL』（光）生理食塩液<br>ドキソルビシン塩酸塩注射液 | 1本<br>40mg/㎡ | 点滴　30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食《50mL》（光）生理食塩液<br>オンコビン注射 | 1本<br>0.6mg/㎡ | 点滴　5分 | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食〔500mL〕「光」<br>注射用エンドキサン | 1本<br>700mg/㎡ | 点滴　1時間 | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 生食『100mL』（光）生理食塩液 | 1本 | 点滴　10分 | | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ヒシナルク3号輸液≪500mL≫ | 1本 | 点滴　1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 生食《50mL》（光）生理食塩液 | 1本 | 点滴　5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 生食【250mL】（光）生理食塩液<br>シスプラチン注 | 1本<br>50mg/㎡ | 点滴　60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | フロセミド注20mg「トーワ」（2mL） | 1本 | 静注one　shot | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ヒシナルク3号輸液≪500mL≫<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL） | 1本<br>8mL | 点滴　1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |