対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
神経内分泌腫瘍	R20552	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ（高催吐）	21日	高度	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ：炎症性
留意事項					
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg(5mL)	1本 9.9mg 1本	点滴　15分	↓																				
2	カルボプラチン点滴静注 生食【250mL】(光)生理食塩液	5AUC 1本	点滴　30分	↓																				
3	生食《50mL》(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴　15分		↓	↓																		
4	エトポシド点滴静注液 生食〔500mL〕「光」	80mg/㎡ 1本	点滴　1時間	↓	↓	↓																		
5	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴　10分	↓	↓	↓																		