対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30003	CVP療法（入院・要ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ処方）	21日	中等度	ｵﾝｺﾋﾞﾝ：壊死性 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性

留意事項

ｵﾝｺﾋﾞﾝ上限値：2mg
併用経口薬：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠（100mg/body/日 day2-5 ）

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食《50mL》（光）生理食塩液 プレドニン20mg水溶性(20mg) アロキシ静注0．75mg（5mL）	1本 100mg 1本	点滴　15分	↓																				
2	オンコビン注射 生理食塩液（光)【50mL】	1.4mg/㎡ 1本	点滴　5分	↓																				
3	エンドキサン注射 生食〔500mL〕「光」	750mg/㎡ 1本	点滴　2時間	↓																				
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓																				