対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30009	ﾄﾚｱｷｼﾝ 90mg/m2（2日分 ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ併用）	28日	中等度	ﾄﾚｱｷｼﾝ：炎症性

留意事項

ﾄﾚｱｷｼﾝ投与時、温罨法
ﾄﾚｱｷｼﾝ投与と同時に、側管から生食250mLを125mL/hrで投与開始、、ﾄﾚｱｷｼﾝ終了時残破棄（※）

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d21	…	…	d28
1	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg（5mL）	1本 9.9mg 1本	点滴 0.4時間	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴 0.4時間		↓																			
3	ﾄﾚｱｷｼﾝ点滴静注 注射用水100mL 生理食塩液「ﾋｶﾘ」250mL	90mg/㎡ 1本 1本	点滴　1時間	↓	↓																			
4	生食【250mL】（光）生理食塩液	1本	側管 点滴　1時間	↓※	↓※																			
5	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓	↓																			