対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30013	G+ﾄﾚｱｷｼﾝ（2回目以降・ｶﾞｻﾞｲﾊﾞday2）	28日	中等度	ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ：非炎症性 ﾄﾚｱｷｼﾝ：炎症性

留意事項

1ｻｲｸﾙ目はｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与 day1,8,15、別途ﾚｼﾞﾒﾝあり（2ｻｲｸﾙ目以降はｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与day1のみ）
前処置薬：ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与30分前ｶﾛﾅｰﾙ錠400mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服
ﾄﾚｱｷｼﾝ投与時、温罨法
ﾄﾚｱｷｼﾝ投与と同時に、側管から生食250mLを125mL/hrで投与開始、、ﾄﾚｱｷｼﾝ終了時残破棄（※）
ｶﾞｻﾞｲﾊﾞはｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用し側管から投与
ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d21	…	…	d28
1	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg（5mL）	1本 9.9mg 1本	点滴 0.4時間	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴 0.4時間		↓																			
3	ﾄﾚｱｷｼﾝ点滴静注 注射用水100mL 生理食塩液「ﾋｶﾘ」250mL	90mg/㎡ 1本 1本	点滴 1時間	↓	↓																			
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 10分	↓	↓																			
5	生食【250mL】（光）生理食塩液	1本	側管 点滴　1時間	↓※	↓※																			
6	生食【250mL】（光）生理食塩液 ガザイバ点滴静注	210mL 1000mg	側管 点滴3.5時間		↓																			
7	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 30分		↓																			