対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30014	G-CHOP療法（2回目以降・要ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ処方・高催吐）	21日	高度	ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ：非炎症性 ｵﾝｺﾋﾞﾝ：壊死性 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ：壊死性 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性

留意事項

1ｻｲｸﾙ目はｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与 day1,8,15、別途ﾚｼﾞﾒﾝあり（2ｻｲｸﾙ目以降はｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与day1のみ）
ｵﾝｺﾋﾞﾝ上限値：2mg
併用経口薬：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠（100mg/body/日 day2-5 ）
前処置薬：ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与30分前ｶﾛﾅｰﾙ錠400mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
水分摂取の励行：投与当日から数日間
ｶﾞｻﾞｲﾊﾞはｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用し投与（※）
ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ投与時、温罨法実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食《50mL》(光)生理食塩液 プレドニン20mg水溶性(20mg) アロキシ静注0. 75mg(5mL)	1本 100mg 1本	点滴　30分	↓※																				
2	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴　30分	↓※																				
3	生食【250mL】(光)生理食塩液 ガザイバ点滴静注	210mL 1000mg	点滴 3.5時間	↓※																				
4	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴　30分	↓※																				
5	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	側管点滴 5分	↓																				
6	オンコビン注射用1mg(1mg) 生理食塩液(光)【50mL】	1.4mg/㎡ 1本	側管 点滴　5分	↓																				
7	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 生食《50mL》(光)生理食塩液	50mg/㎡ 1本	側管 点滴　15分	↓																				
8	エンドキサン注射 生食【250mL】(光)生理食塩液	750mg/㎡ 1本	側管 点滴　30分	↓																				
9	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	側管 点滴　10分	↓																				