対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30015	G-CVP療法（2回目以降・要ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ処方）	21日	中等度	ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ：非炎症性 ｵﾝｺﾋﾞﾝ：壊死性 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性

留意事項

1ｻｲｸﾙ目はｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与 day1,8,15、別途ﾚｼﾞﾒﾝあり（2ｻｲｸﾙ目以降はｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与day1のみ）
ｵﾝｺﾋﾞﾝ上限値：2mg
併用経口薬：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠（100mg/body/日 day2-5 ）
前処置薬：ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与30分前ｶﾛﾅｰﾙ錠400mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服
水分摂取の励行：投与当日から数日間
ｶﾞｻﾞｲﾊﾞはｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用し投与（※）
ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食《50mL》（光）生理食塩液 プレドニン20mg水溶性(20mg) アロキシ静注0. 75mg（5mL）	1本 100mg 1本	点滴 30分	↓※																				
2	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	点滴　30分	↓※																				
3	生食【250mL】（光）生理食塩液 ガザイバ点滴静注	210mL 1000mg	点滴 3.5時間	↓※																				
4	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	点滴　30分	↓※																				
5	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	側管 点滴　5分	↓																				
6	オンコビン注射 生理食塩液（光)【50mL】	1.4mg/㎡ 1本	側管 点滴　5分	↓																				
7	エンドキサン注射 生食【250mL】（光）生理食塩液	750mg/㎡ 1本	側管 点滴　30分	↓																				
8	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	側管 点滴　10分	↓																				