対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30016	GDC療法（要ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ処方・高催吐）	21日	高度	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ：炎症性 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性

留意事項

併用経口薬：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠（40mg/body/日 day2-4 ）
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ投与時、温罨法実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg(5mL)	1本 39.6mg 1本	点滴　30分	↓																				
2	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴　30分								↓													
3	5%ブドウ糖注射液＜100mL＞ ゲムシタビン点滴静注	1本 1000mg/㎡	点滴　30分	↓							↓													
4	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴　10分								↓													
5	生食【250mL】(光)生理食塩液 カルボプラチン点滴静注	1本 5AUC	点滴　1時間	↓																				
6	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴　10分	↓																				