対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30017	GDP療法（要ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ処方・高催吐）	21日	高度	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ：炎症性 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性

留意事項

併用経口薬：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠（40mg/body/日 day2-4 ）
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
水分摂取の励行：ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ投与当日点滴前飲水1L、点滴後飲水1L、翌日から翌々日まで1日飲水1L
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ投与時、温罨法実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食〔500mL〕「光」 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓																				
2	アロキシ静注0.75mg(5mL) ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL 生理食塩液（光）（100mL）	1本 39.6mg 1本	点滴 0.5時間	↓																				
3	ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL 生理食塩液（光）（100mL）	1本 1本	点滴 0.5時間								↓													
4	ゲムシタビン点滴静注 5%ブドウ糖注射液【100mL】	1000mg/㎡ 1本	点滴 0.5時間	↓							↓													
5	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴　1時間	↓																				
6	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分								↓													
7	生食【250mL】（光）生理食塩液 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注	1本 75mg/㎡	点滴　70分	↓																				
8	フロセミド注20mg「トーワ」（2mL）	1本	静注one　shot	↓																				
9	生食〔500mL〕「光」 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴　1時間	↓																				