

| 対象がん腫 | レジメン番号 | レジメン名 | インターバル | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|--------|-------------|--------|-----|---------------------------|
| 悪性リンパ腫 | R30018 | R+VDS-DEX療法 | 7日 | 最小度 | フィルデシン:壊死性 リツキシマブ:非炎症性 |
| 留意事項 | | | | | |
| 前処置薬:リツキシマブ投与30分前カロナル錠400mg、エピナスチン塩酸塩錠10mg内服 day2-4にデカロンが処方される場合あり | | | | | |

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
|----|------------------------------------|----------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | デキサート6.6mg注/2mL 生理食塩液(光)(100mL) | 19.8mg 1本 | 点滴 0.5時間 | ↓ | | | | | | |
| 2 | 注射用フィルデシン 生理食塩液(光)【50mL】 | 3mg/body 1本 | 点滴 5分 | ↓ | | | | | | |
| 3 | 生食《50mL》(光)生理食塩液 | 1本 | 点滴 5分 | ↓ | | | | | | |
| 4 | リツキシマブBS点滴静注 生食[500mL]「光」 | 375mg/m ² 1本 | 点滴 2.5時間 | ↓ | | | | | | |
| 5 | 生食『100mL』(光)生理食塩液 | 1本 | 点滴 10分 | ↓ | | | | | | |