

| | | | | | |
|---|--------|---------------|--------|-----|-----------|
| 対象がん腫 | レジメン番号 | レジメン名 | インターバル | 催吐性 | 血管への影響 |
| 悪性リンパ腫 | R30022 | ガザイバ 初回投与(入院) | 7日 | 最小度 | ガザイバ:非炎症性 |
| 留意事項 | | | | | |
| 前処置薬:ガザイバ投与30分前カロナル錠400mg、エピナスチン塩酸塩錠10mg内服 投与時インラインフィルター使用 ガザイバ投与時、モニター装着 | | | | | |

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
|----|--------------------------------------|-----------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL | 1本 19.8mg | 点滴 30分 | ↓ | | | | | | |
| 2 | 生食《50mL》(光)生理食塩液 | 1本 | 点滴 30分 | ↓ | | | | | | |
| 3 | 生食【250mL】(光)生理食塩液 ガザイバ点滴静注 | 210mL 1000mg | 点滴 5時間 | ↓ | | | | | | |
| 4 | 生食《50mL》(光)生理食塩液 | 1本 | 点滴 30分 | ↓ | | | | | | |