対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30026	ｾﾞｳﾞｧﾘﾝ+ﾘﾂｷｻﾝ（入院）	8日	最小度	ﾘﾂｷｻﾝ：非炎症性

留意事項

前処置薬：ﾘﾂｷｻﾝ投与30分前ｶﾛﾅｰﾙ錠400mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服
ﾘﾂｷｻﾝ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8
1	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	点滴　5分	↓							↓
2	生食〔500mL〕「光」 リツキサン注	1本 250mg/㎡	点滴 2.5時間	↓							↓
3	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓							↓
4	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	側管　ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ・ﾌﾗｯｼｭ用	↓							↓
5	ゼヴァリンインジウム(111In)静注	130MBq/body	RI室で投与 点滴　10分	↓							
6	ゼヴァリンイットリウム(90Y)静注	14.8MBq/Kg	RI室で投与 点滴　10分								↓