対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30027	ﾄﾚｱｷｼﾝ 120mg/m2（再発・難治）	21日	中等度	ﾄﾚｱｷｼﾝ：炎症性
留意事項					
ﾄﾚｱｷｼﾝ投与時、温罨法 ﾄﾚｱｷｼﾝ投与と同時に、側管から生食250mLを125mL/hrで投与開始、、ﾄﾚｱｷｼﾝ終了時残破棄（※）					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg（5mL）	1本 9.9mg 1本	点滴 0.4時間	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴 0.4時間		↓																			
3	ﾄﾚｱｷｼﾝ点滴静注 注射用水100mL 生理食塩液「ﾋｶﾘ」250mL	120mg/㎡ 1本 1本	点滴　1時間	↓	↓																			
4	生食【250mL】（光）生理食塩液	1本	側管 点滴　1時間	↓※	↓※																			
5	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓	↓																			