| 対象がん腫 | ﾚｼﾞﾒﾝ番号 | ﾚｼﾞﾒﾝ名 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悪性リンパ腫 | R30029 | A+CHP療法（入院・要ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ処方・高催吐） | 21日 | 高度 | ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ：壊死性<br>ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性<br>ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ：非炎症性 |

**留意事項**

併用経口薬：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠（100mg/body/日 day2-5 ）
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ投与時、温罨法実施
ｱﾄﾞｾﾄﾘｽは側管から投与（※）

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食《50mL》（光）生理食塩液<br>プレドニン20mg水溶性(20mg)<br>アロキシ静注0. 75mg（5mL） | 1本<br>100mg<br>1本 | 点滴　15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液<br>生食《50mL》（光）生理食塩液 | 50mg/㎡<br>1本 | 点滴　15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | エンドキサン注射<br>生食〔500mL〕「光」 | 750mg/㎡<br>1本 | 点滴　2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食『100mL』（光）生理食塩液 | 1本 | 点滴　10分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食《50mL》（光）生理食塩液 | 1本 | 側管<br>点滴 5分 | ↓ ※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食【250mL】（光）生理食塩液<br>アドセトリス点滴静注<br>注射用水20mL | 1本<br>1.8mg/kg<br>2本 | 側管<br>点滴 1時間 | ↓ ※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 生食『100mL』（光）生理食塩液 | 1本 | 側管<br>点滴 10分 | ↓ ※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |