対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30030	A+CHP療法（外来・要ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ処方・高催吐）	21日	高度	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ：壊死性 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性 ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ：非炎症性

留意事項

併用経口薬：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠（100mg/body/日 day2-5 ）
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
水分摂取の励行：投与当日から数日間
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ投与時、温罨法実施
ｱﾄﾞｾﾄﾘｽは側管から投与（※）

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食《50mL》（光）生理食塩液 プレドニン20mg水溶性(20mg) アロキシ静注0. 75mg（5mL）	1本 100mg 1本	点滴　15分	↓																				
2	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 生食《50mL》（光）生理食塩液	50mg/㎡ 1本	点滴　15分	↓																				
3	エンドキサン注射 生食【250mL】（光）生理食塩液	750mg/㎡ 1本	点滴　30分	↓																				
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓																				
5	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	側管 点滴 5分	↓※																				
6	生食【250mL】（光）生理食塩液 アドセトリス点滴静注 注射用水20mL	1本 1.8mg/kg 2本	側管 点滴 1時間	↓※																				
7	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	側管 点滴 10分	↓※																				