対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30032	V(R)-CAP療法 入院1ｻｲｸﾙｾｯﾄ(要ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ･ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ処方・高催吐)	21日	高度	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ：壊死性 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性 ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ：炎症性

留意事項
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞは、別にﾚｼﾞﾒﾝ処方が必要 併用経口薬：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠（100mg/body/日 day2-5 ） 経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3) ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ投与時、温罨法実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食《50mL》(光)生理食塩液 プレドニン20mg水溶性(20mg) アロキシ静注0．75mg(5mL)	1本 100mg 1本	点滴　15分	↓																				
2	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 生食《50mL》(光)生理食塩液	50mg/㎡ 1本	点滴　15分	↓																				
3	エンドキサン注射 生食〔500mL〕「光」	750mg/㎡ 1本	点滴　2時間	↓																				
4	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴　10分	↓																				
5	ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ注射 生理食塩液 20mL	1.3mg/㎡ 0.52mL/㎡	皮下注射	↓			↓				↓			↓										