対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30033	VR-CAP療法 外来1ｻｲｸﾙｾｯﾄ（要ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ処方・高催吐）	21日	高度	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ：非炎症性 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ：壊死性 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性 ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ：炎症性

留意事項

併用経口薬：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠（100mg/body/日 day2-5 ）
前処置薬：ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与30分前ｶﾛﾅｰﾙ錠400mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
水分摂取の励行：投与当日から数日間
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ投与時、温罨法実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食《50mL》（光）生理食塩液 プレドニン20mg水溶性(20mg) アロキシ静注0. 75mg（5mL）	1本 100mg 1本	点滴　15分	↓																				
2	リツキシマブBS点滴静注 生食〔500mL〕「光」	375mg/㎡ 1本	点滴　2時間	↓																				
3	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 生食《50mL》（光）生理食塩液	50mg/㎡ 1本	点滴　15分	↓																				
4	エンドキサン注射 生食【250mL】（光）生理食塩液	750mg/㎡ 1本	点滴　30分	↓																				
5	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓																				
6	ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ注射 生理食塩液 20mL	1.3mg/㎡ 0.52mL/㎡	皮下注射	↓			↓				↓			↓										