

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30037	ジフォルタ 4回分(day 1-28)	28日	最小度	ジフォルタ:非炎症性
留意事項					
<p>葉酸:ジフォルタ初回投与の10日以上前から葉酸1~1.25mg/回/日を連日投与  ジフォルタの投与を中止または終了する場合には、ジフォルタ最終投与日から30日間は投与を継続  ビタミンB12:ジフォルタ初回投与の10日以上前から、ビタミンB12 1mg/回/8~10週ごとに筋肉注射  ジフォルタ投与期間中は投与を継続  ジフォルタ投与5分前より投与終了30分後まで、クライオセラピーを実施</p>					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	...	d8	d9	d10	d11	...	d15	d16	d17	d18	...	d22	d23	d24	d25	...	d28
1	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓					↓					↓					↓					
2	生食《50mL》(光)生理食塩液 ジフォルタ注射液	30mL 30mg/m <sup>2</sup>	点滴 5分	↓					↓					↓					↓					
3	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓					↓					↓					↓					