

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30039	CEPP(B)療法	28日	中等度	エトポシド:炎症性 エンドキサン:炎症性 ブレオ:非炎症性
留意事項					
エトポシド、エンドキサンは増量の場合あり					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d22	d28
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL アロキシ静注0.75mg(5mL)	1本 9.9mg 1本	点滴 30分	↓							↓													
2	生食《50mL》(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL	1本 1本	点滴 15分		↓	↓																		
3	5%ブドウ糖注射液《500mL》 エトポシド点滴静注液	1本 70mg/m ²	点滴 60分	↓	↓	↓																		
4	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分		↓	↓																		
5	生食[500mL]「光」 注射用エンドキサン	1本 600mg/m ²	点滴 90分	↓							↓													
6	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分								↓													
7	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分															↓						
8	生食『100mL』(光)生理食塩液 ブレオ注射	1本 15mg/m ²	点滴 30分	↓														↓						
9	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓														↓						