対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30040	CHASE療法（高催吐）	28日	高度	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ：炎症性 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性 ｼﾀﾗﾋﾞﾝ：非炎症性

留意事項

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
ｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与日から投与終了翌日まで、ｽﾃﾛｲﾄﾞ点眼1日4回実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d22	…	…	d28
1	生食《50mL》（光）生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL アロキシ静注0. 75mg（5mL）	1本 39.6mg 1本	点滴　15分	↓																				
2	生食《50mL》（光）生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 39.6mg	点滴　15分		↓	↓																		
3	5%ブドウ糖注射液(500mL) ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液	1本 100mg/㎡	点滴　60分	↓	↓	↓																		
4	生食〔500mL〕「光」 エンドキサン注射	1本 1200mg/㎡	点滴　180分	↓																				
5	生食〔500mL〕「光」 シタラビン点滴静注液	1本 2000mg/㎡	点滴　180分		↓	↓																		
6	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓	↓	↓																		