対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30041	DA-EPOCH療法（要ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ処方・高催吐）		高度	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ：炎症性 ｵﾝｺﾋﾞﾝ：壊死性 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ：壊死性 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性

留意事項

併用経口薬：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠60mg/㎡（day1-5 ）増量する場合あり
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3,(4),(5))

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL	1本	点滴 0.5時間	↓	↓	↓	↓	↓																
2	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 オンコビン注射 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 生食〔500mL〕「光」	50mg/㎡ 0.4mg/㎡ 10mg/㎡ 1本	持続点滴 24時間	↓	↓	↓	↓																	
3	エンドキサン100mg注射 生食〔500mL〕「光」	750mg/㎡ 1本	点滴 2時間					↓																
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分					↓																